

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

DIPARTIMENTO TRASVERSALE SALUTE DONNA,
INFANZIA E ADOLESCENZA – FORLÌ-CESENA


Pediatria di Comunità

Convulsioni e Buccolam a scuola

Crisi convulsiva: rigidità muscolare, contrazioni e scosse agli arti, perdita di contatto con l'ambiente, mancata risposta agli stimoli, caduta a terra, sguardo fisso, revulsione degli occhi, alterazione del colorito della cute, perdita di feci e urine, ipersalivazione. Sonnolenza alla fine della crisi.

Cosa fare:

- **annotare l'orario di inizio della crisi;**
- **mantenere la calma e chiedere aiuto;**
- **spostare il soggetto** solo se si trova in posizione pericolosa, **spostare gli oggetti** che potrebbero ferirlo, **mettere qualcosa di morbido** sotto la testa;
- **metterlo in posizione di sicurezza;**
- **chiamare 118;**
- **chiamare i genitori;**
- **somministrare il Buccolam se la crisi dura più di ... minuti**, seguendo le istruzioni del certificato medico e dell'allegato.




Cosa non fare:

- non tentare di arrestare le scosse, non inserire niente in bocca, non schiaffeggiarlo;
- non rialzarlo dopo la crisi, non dargli da bere.


N.B. Tutti gli operatori scolastici devono conoscere l'ubicazione del Buccolam

BUCCOLAM

1 Apri il contenitore di plastica rompendo il sigillo presente ad una estremità ed estrai la siringa predosata.



2 Togli il tappo rosso di chiusura dalla siringa.



3 Controlla che con il tappo rosso sia stato tolto anche il cappuccio bianco di protezione della siringa. (Fig 1)




Fig.1: corretto

Se il cappuccio protettivo rimane attaccato alla siringa (Fig 2) togliilo manualmente prima della somministrazione, per evitare che possa accidentalmente finire nella bocca del paziente.

Fig. 2: non corretto



4 Con l'indice e il pollice pizzica delicatamente la guancia del bambino e tirala indietro. Inserisci la punta della siringa nello spazio fra l'interno della guancia e la gengiva inferiore.



5 Premi lentamente lo stantuffo della siringa fino a quando non si arresta, per somministrare tutta la soluzione nello spazio fra guancia e gengiva (in circa 8-10 secondi). Si può somministrare circa metà dose in un lato della bocca del bambino e poi l'altra metà nell'altro lato.

